## 朝鲜丁香一新变种

## A NEW VARIETY OF SYRINGA DILATATA NAKAI

## 毛叶朝鲜丁香 新变种 图 1

Syringa dilatata Nakai var. pubescens S. D. Zhao var. nov.

A syringa dilatata Nakai var. dilatata follis subtus infra medium dense v. parce pubescentibus; corollarum limbis majoribus 1.6—1.8 cm in diametro tubis longioribus c. 2 cm longis; capsulis minoribus 7—9 mm longis c. 5 mm latis differt.




图 1 毛叶朝鲜丁香。Syringa dilatata Nakai var. pubescens S. D. Zhao. 1. 果枝; 2. 花外形; 3. 花解剖。 (冯金环绘)

Liaoning: Anshan Shi Qian Shan, May. 25. 1956, Chu You-chang, 372 (flowering specimen); Jilin, Jian, Shanchengzi, Shilazi Shan, Sep. 13. 1963, Li Shuh-sin 1296 (fruiting specimen, Holotypus, FPI).

与朝鲜丁香(原变种)的区别点,在于叶背面中部以下被或密或疏的柔毛;花冠檐部较大,直径1.6—1.8 厘米,花冠管较长,约2厘米;蒴果较小,长7—9毫米,宽约5毫米。

辽宁省: 鞍山市(千山),1956年5月25日,朱有昌372(花期)。吉林省:吉安县山城子石砬子山,李书馨1296(果期,模式,FPI)。

赵士洞 Zhao Shi-dong (Institute of Foresty and Pedology, Academia Sinica)